

【用法与用量】 6~12g。

【贮藏】 置通风干燥处。

## 玫 瑰 花

Meiguihua

### FLOS ROSAE RUGOSAE

本品为蔷薇科植物玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb. 的干燥花蕾。春末夏初花将开放时分批采收，及时低温干燥。

【性状】 本品略呈半球形或不规则团状，直径1~2.5cm。花托半球形，与花萼基部合生；萼片5，披针形，黄绿色或棕绿色，被有细柔毛；花瓣多皱缩，展平后宽卵形，呈覆瓦状排列，紫红色，有的黄棕色；雄蕊多数，黄褐色。体轻，质脆。气芳香浓郁，味微苦涩。

【鉴别】 本品萼片表面观：非腺毛较密，单细胞，多弯曲，长136~680 $\mu$ m，壁厚，木化。腺毛头部多细胞，扁球形，直径64~180 $\mu$ m，柄部多列性，长50~340 $\mu$ m，基部有时可见单细胞分枝。草酸钙簇晶直径9~25 $\mu$ m。

【性味与归经】 甘、微苦，温。归肝、脾经。

【功能与主治】 行气解郁，和血，止痛。用于肝胃气痛，食少呕恶，月经不调，跌扑伤痛。

【用法与用量】 1.5~6g。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭保存，防潮。

## 青 木 香

Qingmuxiang

### RADIX ARISTOLOCHIAE

本品为马兜铃科植物马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形或扁圆柱形，略弯曲，长3~15cm，直径0.5~1.5cm。表面黄褐色或灰棕色，粗糙不平，有纵皱纹及须根痕。质脆，易折断，断面不平坦，皮部淡黄色，木部宽广，射线类白色，放射状排列，形成层环明显，黄棕色。气香特异，味苦。

【鉴别】 本品横切面：木栓层为数列棕色木栓细胞，皮层中散有油细胞，内含黄棕色油滴。韧皮部较宽，亦有油细胞，形成层成环。木射线宽广，薄壁组织较发达；木质部常有几束较长大，自中央向外成放射状排列，其余较短小，由导管、管胞、木纤维组成，导管直径至120 $\mu$ m。薄壁细胞含淀粉粒，单粒圆形或椭圆形，直径至117 $\mu$ m；复粒由2~21分粒组成。

【炮制】 除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。